

角鸕鷀

Podiceps auritus (Linnaeus, 1758)

英名： Slavonian Grebe (Horned Grebe)

命名文獻：

Linnaeus, C. 1758. Syst. Nat. ed. 10, 1 : 135 (採集地：瑞典)

模式標本收藏地： 不詳。

台灣首次紀錄：

李建安。1986。冠羽 16 : 12。

出現在台灣的亞種：

P. a. auritus (Linnaeus, 1758)

亞種命名文獻：

Linnaeus, C. 1758. Syst. Nat. ed. 10, 1 : 135 (採集地：瑞典) **模式標本收藏地：** 不詳。

學名說明：

Podiceps 為拉丁文 Podex，是 podicis 和 pes 的合併字，前者指「肛門」，後者指「腳」，鸕鷀的腳長在身體後方近肛門處。*auritus* 為拉丁文 auris，即耳朵的意思。

同種異名：

Colymbus auritus Linnaeus, 1758

Podiceps arcticus Boie, 1822

Colymbus cornutus (Gmelin, 1789)

【亞種與分類討論】

本種分為2個亞種，台灣的亞種是 *auritus*，亞種條列如下：

P. a. auritus 分布於冰島、蘇格蘭北部至歐洲及亞洲中部和東部。*P. a. cornutus* 分布於北美洲。

【外部形值】



形態特徵： 夏季頭、後頸和體背黑色，眼後有一道金黃和紅色飾羽；前頸、胸和腹側栗紅色；初級飛羽黑褐色，次級飛羽白色。冬季頭、後頸和體背黑褐色；喉、前頸、胸和腹白色。眼紅色。喙灰黑色，先端黃色；腳暗褐色。

測量值： 本種在台灣尚無測量資料。

【地理分布】

於古北區的水域繁殖，到中國沿海、日本、美國加州和德州越冬。

台灣見於低海拔平原的濕地。



【生態與生物學】

棲地與習性：大多單獨活動，偶爾也見成對活動於淡水湖泊、水塘和海灣。善潛游至水中追逐食物。

食性：節肢動物、魚類、水生昆蟲、水生無脊椎動物如軟體動物、甲殼類、蠕蟲等。

鳴叫聲：不詳。

繁殖：台灣沒有繁殖紀錄。

【遷留型態】

角鵞目前為稀有的冬候鳥。李建安等（1986）於台北市內湖大湖公園有發現紀錄。饒正（1986）於宜蘭竹安也有觀察紀錄。台南、台北內湖、宜蘭竹安和蘭陽溪口均有發現紀錄（王嘉雄等1991）。林長興（1999）於澎湖縣馬公市雙湖園發現1隻。

【現況與保育】

角鵞目前並無全球性的威脅（Llimona & del Hoyo 1992）。

【參考文獻】

王嘉雄、吳森雄、黃光瀛、楊秀英、蔡仲晃、蔡牧起、蕭慶亮。1991。台灣野鳥圖鑑。亞舍圖書有限公司。台北。

李建安。1986。新紀錄種角鵞。冠羽16：12。

林長興。1999。角鵞。中華飛羽12（3）：2-3。

饒正。1987。稀有鳥種報告—角鵞。冠羽17：22。


Llimona F, del Hoyo J. 1992. Family Podicipidae. In: del Hoyo J, Elliott A, Sargatal J. eds. Handbook of the birds of the world. V.1. Ostrich to Ducks. Lynx Editions, Barcelona. Pp:174-196



角鵞的繁殖羽，頭、後頸和體背黑色，眼後有一道金黃和紅色飾羽，前頸、胸和腹側栗紅色。（曾秋文攝於國外）



角鵜鶘在台灣為稀有之冬候鳥。(潘明鵜鶘)



角鵜鶘冬季時頭、後頸和體背為黑褐色，喉、前頸、胸和腹為白色。(潘明鵜鶘)